

Ne Yapılması Gerekir?

Ailenin bu konuda bilgilenebilmesi ve duygusal olarak

hastalığın 2. evresine kendini hazırlaması

İleride ortaya çıkabilecek davranış problemleriyle baş

etme konusunda eğitim alması

Anne ve babanın, ve çocuğun çevresindeki diğer

bireylerin, davranış değiştirme tekniklerini en kısa

sürede bir uzmandan öğrenmesi

Çocuğun, obeziteyi önlemek amacıyla yaşamı boyunca sıkı

bir diyet altında tutulması ve bu diyetin başlanması

için hiç vakit kaybetmeden bir hekime başvurulması

Konuşma terapisine başlanması

Büyüme hormonu takviye edilmeli

Obezite durumu çok tehlikeli, hatta ölümcül boyutlara

ulaşabildiğinden, çocuğun çevresindeki ve

okulundaki herkesin bu konuda haberdar edilmesi

Vitamin ve kalsiyum takviyeli, düşük kalorili bir diyet

uygulanmalı

Acı eşiklerinin yüksek olmasından dolayı, mikrobik

durumları tespit etmek zordur. Bu nedenle de

sürekli takip altında olmaları gerekir.

Çocuğun yoğun olarak kustuğu zamanlarda mutlaka bir

doktora gösterilmesi

Motor becerilerini geliştirmek için vakit kaybetmeden

fizik tedaviye başlanması

AİLE EĞİTİMİ VE DESTEĞİ



Prader-Willi Sendromu



Prader -Willi Sendromu

Çocuğun anne karnında döllendiği sırada, bilinmeyen sebeplerle 15. kromozomun yanlış bölünmesinden kaynaklanan genetik bir bozukluktur. Nadir görülen bir bozukluk gibi görünse de, en fazla sıklıkta ortaya çıkan genetik bozukluktur. Genellikle genetik ve doğumla gelen bir sendrom olmasına rağmen, doğumdan sonra hipotalamusa verilen bir zarar da bu sendromun oluşumuna neden olabilir.



Fiziksel özellikleri

- Badem gözler
- Kısa boy
- Gevşek kaslar
- Belirgin ve dar yüz hatları
- Küçük eller
- Küçük cinsel organ
- Koyu tükürük
- Göz problemleri
- İnce üst dudak, küçük ağız



Sebebi Olduğu Durumlar

1. Evrede:

- Sürekli uyku durumu
- Solunum problemleri
- Cinsel organların az gelişmiş olması
- 6 yaşına kadar genel gelişimsel bozukluk
- 6 yaşından önce aşırı iştah, ilerleyen yaşlarda obezite
- Büyüme hormonunun azlığı
- İnce ses tonu
- Yüksek ya da düşük vücut ısısı

2. Evrede:

- Hafif ya da orta derecede zihinsel gerilik (40-105 arası IQ)
- Koordinasyon, denge ve kuvvet gibi motor becerilerde gerilik
- Gecikmiş konuşma
- Kısa süreli bellekte, dikkat ve kavramada gerilik
- Davranış problemleri (inatçılık, tutturma, öfke nöbetleri, kavgacı kişilik, obsesif davranışlar, çalma)
- Yaralarını koparma
- İleri yaşlarda 2. tip şeker hastalığı
- Horlama
- Romatizmal problemler
- Yüksek tansiyon
- Sağ taraflı kalp yetersizliği
- Mide ülseri

